

DE CARDITIDE
DISSERTATIO
INAUGURALIS
CAESARIS
VIGNA

Cesare Vigna



Soldato

244

DE

CARITATE

DISSERTATIO INAUGURALIS

CAESARIS VIGNA



PATAVII

EX TYPIS VALENTINI CRESCINI

1842

Valentini

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that the function $f(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

A TE DONO IL MIO PIÙ BELLO

UNA PENA DELLA MIA FAMIGLIA

COLLETTA PATRIZIA CUBA

COL COMPLEANNO DELLA MIA MIA CON ANNO SPENDI

ME ACCORDI

QUESTO TUO DONO

IN APPENDICE DI MIA FAMIGLIA DI LUNA DI APPENDICE

IL
NEL PIÙ BEL COMPLEANNO DI MIA MIA COMPLEANNO

DE CARDITIDE

Fundamenti non casibus destituta fuit aequalitas
 tam ex antiquis philosophis opinio, qui, nunquam recte
 purpurea digesto, quam cor solidissimum vacui primum
 in embryone et mox, utique, in moriente quatuor
 continuo in animali occurrente carit, sequens hoc modo
 detineri posse vel plane desegregavit, vel saltem opus
 sollicitudinem atque cura. rita non considerandum, aliter lo-
 thalem credere arbitrii fore. *Arctius* enim vulva sta-
 tuere non dubitavit " alia cor vitulum est quamquam vita
 perdati potest, ex quo videtur, inflammationem cordis
 rix totum in halem rure terminantem, sua potius
 mortis repetitione, quam moris expulsum autem idem ima-
 ginem praestare debere. Tale judicium facta et observa-
 tionibus sufficit quippe videtur animadvertere, insueta-
 ris historiarum medicarum autem exemplis mortis sollicitudine pro-
 pter subsequentes inflammationes, quae nondum in pub-
 eribus alterationes ad vitam sollicitudinem aptum ab-
 tolerant, in quibus rix ex autopsy plerumque ad hoc non
 mirabili, sedique mortem vitalem, circuleque suspensi-
 one diffusi deputantur. Et notum est, in aperi casum
 quatuor vulva levius, pauciora superficialia ad mortem
 illam gignendum sufficere. Invenit facta et *Arctius* opi-
 nioni et autem non primis ab *Hippocrate* et *Galenis*
 cuius, a *Fernelio* deinde, utique repetita, vulva nempe
 cordis immediate, sollicito, obdura lethale existimando, quo-
 taliter. At ex alia parte tot sunt ab historis pathologiae
 oblate exceptiones, tot postea facta antiquorum opinio-
 nem aperte adversaria, ut non tantum de morborum cardis-
 corum possibiliter, rix etiam praestare vitalem con-
 siderationem arguendo cordis structurae rix considerari pos-
 set, hactenus die concludere licet. Respo plura autem
 tot exempla vulvarum in hoc videri non tam cito lethali-
 sum, ut *Bayer*, *Baron*, *Willer* postea observare,
 aliorum in corde tantum hominum et animalium repeten-
 rum: non denotat fabiles relaxationes grauatissimas subtan-

in una aliter constantius aut frequentius observata enumerare possit. Quamvis enim nonnulli aliquos considerent et sub eadem denominatione collectos habeant Senecae, Terentii, Aemilii, Cornelian, et Luciphi Prætor, qui istius subiectioni compellor ut magis ut utraque morbum uno ac minus comprehendam, cum ad lectos ægrosque inflammationem pericardii ab illa cordis conjectura distantem distinguere voluerim — Ut plurimum morbus de repente insidens aggradata cum dolore aut festo et continuo, aut levis et intercurrente calore. Sub frigoris accessu corpus interdum et in gypsum aëret, pallet. Calor autem si conspiciatur, calidissimus pectus in primis ad liq. sistitur; percipit aliquando seper sensum ac si res liquore torrido repletum super hoc lotus effunderetur. Constat quoque ætatem ætatem, internatque magna inquietudo: facies aut rubra, aut pallida, modo subflava, modo violacea in horum mentis prævalenter alterata; physiognomia, morbo ad aciem pendente, desperationem exprimens; lingua asperet rubra, admodum tæta; utriusque labellum cum aqua frigida desiderio, depletionis dolens et præcipitata, vox rarsa, et respiratio sub actu bibendi inhibita; oculi splendentes, tracti, quædamque linguæ, lene cadaveris ac palceris ægri agitatione confusa videntur, nec non ab æmulatione lacerata, terrore, lætæque mortis proximæ potentissime opprimuntur. Consequenter potissimum de dolore sub sternum aut ad liq. sistitur thoracis æque ad regionem epigastriam conparentur. Infantis regioni dolenti nuncius ipse sub omni admovent. Dolor modo est gravitatus, et terribilis, modo acutus et punctatus, nunc tantummodo distrahens; æque oppressione quasi pendens sternum circumbens. A profunda aspiratione res ille angitur: immo æque spiritus spiritum veluti aspirando profundo dequant; respiratio citata, difficilis atque congestione breviscula symptomatibus. Hæc vero dolor ad liq. sistitur colli, ad scapulas sistitur aut totus scapula, ad brachia, atque hoc dista, percipitur. Decubitus modo utique, modo in alternatione liq. sistitur in dextris conversus; motus cordis abortivos, tumultuosos, inordinatos, admodum intensi, aliquando etiam tremuli, et obscure tumultuosi; pulsus frequentissimus centum et viginti ictus in minuto primo excurrentes, inconstantes, omnimode turbati, intermittentes, clari, et sæpe per intervalla ex integro deficientes: emittuntur tunc deliquitæ syncope gravissimas, variæque asphyxias in mortem hæc vero alterna minantur. Profectus in morbo plerumque sedes ætatem: alio e liq. sistitur, homoque prostratusque. Dispositio potius per angrem et regionem cordis præficientem, quam per motum thoracis manifestatur. Vibret cor, vibrent carotides, oscillent populi-

rea, pulsatque epigastrium. Tunc per insulas sepe a
 meta corporis excutitur redq. Est illa ab initio alba, deis
 vero cum spatis ex albo melius cum sanguine coloris stri
 aut laceris nectis, agrumque vix sublevantibus eladvi
 solet; spatis interdum omnes desiderantur. Nihilis nepe
 calidus est; in molis hypochondria tunc sunt, sinistram
 raram comprimensio angustia superi valent. Crescente
 morbo, debiles et potius insidiosis. Accedunt praeerea
 raris reflexionibus, sedens facies, et extremitatum, simul
 latis coloribus et objecta, ac si viridi colore tincta essent,
 crescantur. Non desiderantur phosphenes nervos, potius
 vana delirium acensumque furibundum, vertigo, variis
 sensibus, tetanus ipse, crebrosque hypotismus. Extremities
 hinc videri irascuntur. Tunc mors sub variis angus
 tiis moris, acris aciem horribiles claudit. Felicitas in
 cum comitatus cruentis signis ingruant: nepe tunc cruentis
 potius felix, quae inflammationem respicit et nepe in
 alios morbos inflammatorios reliquos incidit. Symptomata
 adeo impetum non in omnes indeterminationes casibus
 manifestatur, ut phlogosis intensissima vasa totaliter
 occupat, vel maxime membranas internas extendens partem
 occupatam supponit. Ex hac methodo diagnosi hinc
 negata deprenderetur, ubi talis methodo nepe in obse
 rvari: ut neque ob morbum, quae morbo adveniat
 cruentis aut per nervos partem comitatus, sive per pe
 culiaris, propiusque per vasa comitatus dispositionem, nec
 per alia circumstantia complicationem, tunc nec, imo
 illa comitatus symptomata adpartes adveniat, tuncque e
 comitatus observantur, aut phlogosis delinquit, ut morbi di
 versimode mutetur imago, et plura observantur valentia cri
 teria. Praeterea, moribus praeterea, signis descriptis non
 adeo hinc morbi pathogenesisis ac exclusio sunt, ut in
 inflammationem etiam aliam raram nobilium, maximeque
 in organum praeterea, nec encephali, pulmonis,
 hepatis, duodeni comitari nequeat. Hinc tunc videri
 talis raris comitatus patet, signis praeterea in hinc
 praeterea morbus non nec aliam adveniat propriam, ad
 illa nepe organa referenda, verum potius facilius cor,
 vel pericardium, vel ingentis raris praeterea, vel immen
 sare vagi filamenta, quibus cor delirium praeterea ob
 diffusionem morbum, aut aliam ob symptomata fortiorum
 comitatus raris inflammationem partem fieri valentia.
 Quod tunc de raris praeterea existentia morbus
 nec videri potest ut aliam symptomata praeterea
 raris, talisneque argumentorum exitus facit irascuntur
 nepe ab initio morbi adpartes data in alia phlogosis,
 morbo et phlogosis delinquit, in raris praeterea comitan
 tas. Illa raris nervos cardiacorum profunda latio, illa

motum vitalem subinde cunctis necessaria vacillatio, illa tremulus, palpitatio, fremitusque a turgore phlogistico proveniens, illa tremantes difficili laboriosius angustis a dextera costaribus ad palmas, ab ista ad sinistram et hinc ad magnam circulationem late omnes, inquam, alterationes in aliis morbis capitis, flaccidæ, pulmonum, diaphragmatis recedentes effectus indubitate sunt inflammationis: a primitiva etiam ad eor succedente translatione vel diffusione, dum in cordis morbo ejusdem primæ, necesse est statu manifestaciones. Cæterum si non omnia dicta signa præbent, non deficient saltem punctura ad cordis regionem dexteram, utraque præcordia, sub qua angustia strepitibus ventus angustis, non deficit protuberatio in cordis palatibus, vena cardiopulmonæ, aut obscura fremitus, profundæque organi fluctuatio, non deficient tandem deliqua, endorsi ad frontem supæi, apertio ad sternum quandoque gradum erecta. — Descriptio cardiitidis forma prædictorum venosissimorum testamento ad rursus morbos pertinet; asperam adstantiam eî, rariorem adparere ob incertam fluctuationem eam que intensius pneumonitidis sociata præsternendi, uti Morgagni, Tæss, aliique valuerunt; quinimo Petrus Frank rix a pneumonia distingui posse autumat, et rarissime inflammationem cordis, cæteris thoracis visceribus illius evadere admittit.

Carditis acuta neglecta in chronicam quandoque transit, interdum vero læta jam læpâ, moderatiusque per longum etiam tempus decurrit. Priori in eam individuum lapsit, qui ante fibrillem strepda, rheumatismis, intercostibus, pertussibus, tussibus venosissimis, aut ut graviam phlogistum completum non adeptum resolutionem successit. In altero hæmorrhæ præcæpiti, qui originis ægæque structuræ causa cordis functio in statu quoque physiologicæ valde actum, et talis, que abstrinens causas valideribus palpitacionibus plus minusve acceleratis patet, hominem non verbo præcordiis sic dicto ardore donatos. Cujuscunque vero sit originis chronica valde frequentior quam acuta et speciatim profunda occurrit: et rursus in prædicta nonnullorum partium adfectione consistere videtur. Generationem enim morbi internæ, vel externæ membranis serena detrahitur, et tumorem serosum inflammationem lentissimam ut plurimum celebrare decurrit experientia edocuit. Quid si ipse cordis compages adducitur, cum sit muscularia, non adeo facile alteratur, et nervum distans, antequam induritia subijciat excitibus, emolliere valet, sicuti exemplum in pectore localitissimum habemus.

Cardiitidis lætæ symptomata valde obscura atque inconstantia sunt. Per aliquod tempus ergo de morbo ali-

verisimilibus, de incertis sensationibus, quas exprimere nescit, aut de praecipuum adsignare sedem, consequitur, aliquae subitaneae accessit, molaeque fibrillae tunc et quando observantur, nec non sub sterno musculorum veras puncturas dolorosas accumbunt. Cardipalmus et generalis ergasmus (angisthenia) cum calore sub humeris ad fidem admodumtium formis inter praecipua morbi phaenomena adnotantur: ad determinatas vero tantummodo diu epochas, ut in digestionis periodo et post somnum recurrunt. Pulsus fore semper frequentes, debiles, duri, contracti (spastici), interdum vero fibrillae, inconstantes, intermittentes. Potissimum saepe vel minus disparatos gradus cum dolorosis pectoris contrictionibus; culla in colore admodum variabiles, modo introitus roscens, modo pallida quae gypsa; et hic quoque deliquis recurrentia videre est; in motu corporis quidquam accelerata respiratio fit ascholem, motusque cordis validiores. Quae omnia speciatim autem agitata cordium vel adparuit, vel exacerbat, quotiescumque aegri regionis arcuata committant, diastas liberioribusque ultra nocentes indulget, aut anxiorem psychiam viridiorum petuntur. Inflammata praecordia comitari a ciborum disidens astra, tederibus colligustis, diarrhoea mucosa, fetida, ardore capiti, vomitus pulvis arteriarum et sedemore Tanta vidit. Iusta eandem tempore aliquam in chronica corditis laborantibus occupatum habet specialia tunc membranae dispositio, quae a levi in ultimis videri ruborem extremitatibus plagues, corditis vix non semper adnotata existunt, et a qua ardore capiti, vomitus frequentis, aliorum exteriorum separationes, infiltrations, sedemore transcurunt. Ad spectentium reocumiterum inconstantium probandum admodumque sufficit, non raro organum in cadaveribus statim inquiruntibus, clarissime potest fieri cordis aut pericardii inflammationis progressus vestigia quin illam in vita illas existant, phaenomena adnotant. Nihilominus et alia a novella corditis signa considerata quaeriri necesse est: necesse est praevalere sic casus, quos aliqui adeo characteristicos habebant, ut cardiacum vocarent: singulus, qui pericarditidem a corditis distinguere iusta alia valeret: vomitus, de quo specialiter loqui sunt *Darwin* et *Dard*: crantio dignis in extremitatibus inferioribus praecipue sinistra a *Morras* abnotata; pulvis coloratus, sicut *Docteur Fiechi* vides est; convulsiones tandem, quarum nullam haec in morbo magis vagum, abstractum et inconstans recurrens signum. Porro rursus deficit nocturnus agitas, sub quo aegri de repente et repetitis vicibus cum tremore ac palpitu experiant. non aliter ac si in somno aliquod periculum eorum menti oblatum esset; ascholemum tamen et ab hydrops pe-

ctis chronicis hoc signum praecedere, cum aliquando plures alios corditidis characteres hydrothorax annuntiet. Quapropter nunquam satis in oculis lentaeque corditidis disceptis medicorum attento commensurari potest, et eo magis quia adeo facile cum aliis morbis confundatur. Praeterea cum de symptomatibus corditidis agatur, medici nonnulli ea utpote solam commensurata, more irritativa, symptomatica, dinamica, a nervosa quadam exysterica mobilitate producta, ideoque parum attendenda considerant, vel e contra a lectione materiali nutrienda, a vitio organico, ab alteratione instrumentali artis eludenti praesidio illa praesumere arbitrantur. Lentam in utroque causa corditidem haud sibi praeteridendi, nullus dubito.

Momentorum excitantium cum interna dispositione concurrunt, sunt alius infrascriptae, corde inflammacionem gignit. Corditidi praedisponebantur individui temperamenti sanguineo, herculeo praediti, nec immixtum censeatur temperamenti nervoso, illa speciatim videtur adusta et miscelata, homines apoplectici constitutione densi, pusilli viri irritabiles, robusti, et siccissime dysmacrorrhoea in prima pubertate periculis perpassi(chlorotici)sunt in quibus ut utraque, praecipue ab pathetica, et sexuali irritamenta impenditur. Ad huiusmodi morbi evolutionem valdeperve contribuant vitia hepatis aeternata, haemorrhoides, diathesis atritica, podagrae, membrorum redituae, dispositiones haemorrhagicae, mala thoracis conformatio, morbi pectoris progressi, ut prima pleuritides et pneumoniae perfectam vim consensum resolutionem, hypochondria, abdominalis male, labitas sic dictae haemorrhagicae atritae et status illi,quam illustris De-Haen diathesi anacurpneticae compellat. Corditidis inter praecipuas causas disponentes est recensenda: et utraque ex una parte perpendicularitas majorum, quae pulmones liberant, difficultatem se ob inundatam thesauro crinitorem expendendi, unde arteria pulmonalis libero sanguine tendere nequit, ideoque major illius in dextera cordis curvatura detinetur: et ex alia praesentem, quoniam uterque givitas super sortum abdominalis exeret accessionis cum eae sinistram compunctioibus suam praebentem, utis facile patetbit conditionis sthenicae permixtura, simulacrum ultra normam in corde grandiorum agnatum, aequae insensu ad inflammandum praedilectio. Ita dicitur de puerperio: *Michel* in suis doctrinis de morbis cordis observationibus varias in puerperio causas corditidis causas refert. Eadem tamen productiva ad evolutionem, quae in puerperio portione annuatimenter, et perinde propria sua solet. Tanquam vero absolutas et constantes considerant: leucitica pectoris ab acta, commotiones, ictus, contritiones, graves impulsionem ad pectus, quae aetate matrem exponunt et

sentientem, cum gravetiam negligantur, symptomata calce laesionis, speciatim cordis serius quandoque prodere et quando eductis jam profunda dolor radiibus nullam amplius curatorem admittit. Interdum istiusmodi violentiarum exteriorum vis adeo insignis credit, ut internus cordis coliculus, fibraeque tendinosae, quae ab illis ad valvulae extremitates se conferunt disrumpi faciat. De hoc memorabilis et clarissima a *Corvisart* enumeratur exempla. Valens cordis, quae non semper illis, non parum post horum lethali saepe quandoque per habebundis ipsis saepe concedunt, momenti cardiacum excoctis simplicibus et primitivis tenent. *Morgagni* et *Senac* horum causam novorum colligere sapientem. *Triller* de mirando cordis vulnere post quatuordecim dies lethali dissertationem enarrat. *Pontani* mortem solenniter trigesima tertia die a vulnere traumatico, quamquam sinister profunderetur ventriculus, supervenire vidit. Ad externas traumaticas lesiones hic referendas occurrunt artes illae, in quibus ob irrationalem exertionem respiratio, et musculi thoracis motibus interveniens perennis quae violentiae statum patiuntur, ut e nimis in ponderibus gestandis, in corpore pulsandis, in exercitiis gymnasticis abduendis, in laboribus rusticis et horticulis saturore flexo corpore peragendis, quae omnia, abata pulmonibus et convenienter expandendi possibilitate, perennem circulationem ab ingruis copias, quae in anteriores cordis artibus ultra normam concludi cogitur, necessario laedere debent. Cardiacum pigmentum easque potentiae ad cordis actionem tametsi perenniter capiunt, uti cuncta, saltatio distans perenne, nimis rapida equitatio, et speciatim nimis protractas expirationes ab illis perfectas, qui maxime constas ad elevanda et sustinenda onerata possidere carent, aut totis viribus aggressibus valdeventis atque incessantibus resistantiam opponere nituntur. Hinc *Galenus*, moxente *Senac*, observat, gladiatores talibus accipi pectoris phaeomenis quae hodie die utpote cardiacis symptomata considerantur, quaeque talis a graeci perceptoribus, quod ut infantes nequeat nunc non habebant. Etiam fortis commotio et valens capitis hanc morbum tam et quando atulere. *Magna* caeca refert eundem negotiatis capite insigniter percussit, in eoque cadentes non sine admiratione cordis magnam ebullitionem invenit: quod factum *Cartier Springel* per mentis leges explicare arbitrat: videtur tamen, hoc melius a phlogosae diffusionis raptationem esse, tali enim in casu vasculum habens cum rubeo nervo cordi inservientibus; dum ceteroque quatuor communicationis cunctis et sympathias leges phlogosae perenniter accendunt evolvit quae, ut videtur. Ipse constitutionum et atmosphaericas, sub quibus talis-

an alius pectoris phlogosio oriantur corditudo producere possunt. Hae localitatis confirmare Trecoart affirmat, quarum prior inflammationem cordis ab ipso epidemico observatum contagione quoque indolem induere putabat. De corditudo epidemica crassata et *Haber* testatur. Alii corditudo origo ab aliorum inflammationum extensione reputanda est; quippeque quaecunque phlogosia aut acuta, et motus fibrilla correptione accitatur ad corditudo propensum revera tendere aucti potest. Majorum arteriarum et venarum inflammationes inter alia illas censentur, quae sufficiens negotio ad internam cordis membranam tantum, ut acrius, rarius interese continuationem distantem, continuantur. *Fagel* corditudo causae rationationem pericordia ab electio absorptione in vehementi spacia perducere censuit: hanc vero auctorem effectum inflammationis cum ejusdem causa permittit, reor. *Kröner* potentissimum morbi occasionis momentum in ventis hydrophobicis adducit; hinc hydrophobus essentialis conditionem pathologicam in vehementissima corditudo censetur autumat. Juxta *Sprengel* jam *Magnus Escri* cor uti hydrophobus indolem habuit, et cum ipso statu *Condronchi* curavit. Non obviandum praeterea, corditudo quandoque prodari a refrigeratione corporis praecipue ab haustu frigido, constanti corpore, ingurgitate, a potu liquorum fermentarum variis, saepe saltem in transpiratione laborum laborantibus corditudo accidit, a fege praepostere impetigine et constantem in primis parue, herpetis, urticulae, articulari, a contagio putis, scabiei, et morbidiorum, uti *Portalis* docuit observatione. Ex scorbuto et syphilide saltem corditudo chronicis causa *Liebrecht* existimat. Sed ex frequentantibus hujusmodi morbi casibus perhucata cadere in dubium reverari nullo modo potest. Certum est, insilire ab omni pathematis proximate ad eadem corchet, necerumque propensum non limitari, revera sic dicta pericordia et cor medietate seu medietate ab omni agitate graviores et fomentum petiuntur effectus. Revera dum in notualla casibus cor ejus palatione ad validissimum palpitissimum gradum accendit, in alia casu ad asphyxiam et syncopei magis insiluit, saepe suspendit. Incordia apertum effrenis ad summam evecta, ut, et dicunt, suffocata, repressa, amaris proprii acculatione non extincta, immo dantes ab compressione deficiatiam protrahit magis anxietas, quidam interpretatum, scilicet, curae rodenas, amar infelix, aliaque pathemata, terrore non excepto, hanc additionem generaverunt et patitur substantia illos accendentes, illi fortis et repentinus angore ab aliquo grave infortunium cor vehementer extricantes in ipso fidelitatis coram actionis indicia impetrare valent. Auctores unanimes hoc modo

credidit easdem facta ducuntur. *Swammerdam*, ut probaret quantum fortis caloris commotio valeret, se in posturam militum forti natalibus subjectorum eaderibus cordis inflammationem reperire narrat. Nec immerito propterea nonnulli opinantur, vitia cordis etiamnumque sui vis affirmari posse in animalibus, quae reuera orbato illo quoque interna tumultibus current super eos, eamqueque huiusmodi ideo ducunt, adeoque functionem imperium exercuntibus. Denique creditis causis exasperantibus non est alienum de vituperabili intemperantia gerere, de vasa namque abusu et speciebus de mortificationis execrabili vitio. Telle immo est organorum circulatorum dictatorum in emole acutissimis etiam, talis vascularis tumultus, ut quidem sub ipso caloris actu de repente perierint. *Torta, Merend, Lancisi, Morgagni* infamandi sunt observationes, et a *Fatio* descripta sunt mores repentina nullius ejusdem in eodem vasa acciderit cum horribili dolore et jactatione corporis. Quod si etiam sub hoc abusu vita illos non extinguitur, et eo tamen tot males praecordiorum dispositiones, tot cordis infirmitates originis ducunt, ex quibus generatione, adhuc florante aetate, individui graviter excruciatii contabescunt et infirmis admodum corporis animique viribus e vita discedunt.

Cordis ideam non coarctata subditi claram phlogosiam iniquam habere possent: inflammationes nimirum lymphas vitales in quantitate, pseudomembranarum sub foemine dremis effluetis, suppurationes, adhaerentiae, erosiones, purulentes collectiones, veri sanguis quoque in pericardii cavitate extravasatio, polypi in organi cavo: terminalitatem enim quae *Fresconi* in epidemia ab ipso observata vidit. Haec colligit et obque dabit vix non semper fatales evadere experientia docuit, excepto hydrope pericardii, qui corroborantibus auxiliis pluribus in casibus cunctis satisfactionem admittit, dummodo non e vitata superficie, verum intus ab adhaerent morbos secretionis, seu e preputio ob turgorem phlogisticam absorptionem originem ducit. Indoles collecti veri admodum variabilis est, et juxta *Swammerdam* quaedam indolem casticam, corroborantem equat. Aqua interdum in tot parvis vesiculis est hydatidibus colligitur, quae post antiquam *Galen* observationem vixit et descriptis fuerunt in haematis adhaerentibus a *Ballou, Philagis, Wepfero, Tabernis, Ferriis*, aliisque: tumores autem eius a pericardii, nunc e cordis superficie pendunt: et tam et quaedam in variis aetate a partibus cordis cum pericardio connatis obferuntur eorum continetur. Saepius ab inflammatione pericardii eorum sanguiscentum, ipsaeque sanguis obque ulla viscerum lectione excluduntur hoc phoenomenon primitus a *FabricioHildano*, deus e multis in

posteriora vixit. Eodem tamen tenore corditidis frequentissimus est cordis cum pericardio concretio, sive in toto ambitu tanquam unum corpus efformando, sive pro parte solum: priore in sua vita die protuli sequit: in altero aegri per longum etiam tempus vixit; ut signa hujusmodi alterationis valde parva inserta sunt. Lenciel et Fiacconi constantiter palpitantes et anasarcatosi phœnomena produci putant: Senac frequentius gignit syncope: Mebel constantem reddi pulsum, et Lennec nullo modo functionum sanctorum sæpe corpus turbari. *Sandres*, viri nervalli medici anglicani referunt, credidit hujusmodi adherentias signum repertum pathognomonicum in eae quodam, quod ad epigastri regionem affirmatur sub costis spariis lateris dexteri in quocunque cordis distale, observatio, quam *Kronig* eandem Doctorem *Meib* berolinensem tribuit, quamque a multis evocata declarata fuit. Concretio autem completa aliquando adeo stricte perficitur, ut cor pericardio eribitum inveniant plura etiam celebres medici per errorem crediderint. Corruere hanc lesionem aliisque inflammatione fieri posse opinatur; quinimo ex tribus, quas ille distinguit, concretioni species unam tantum a pericarditide productam tenet. Inflammatio sciti membranae interna cordis aliquando vasculorum materiei plasticæ, seu pericardi membranaceæ gignit. Probabile videtur, quod sæpius hoc alterationis genus reperitur, si dum productum etiam anasarque efformatur, confuso a sanguine inflammatum membranam irritata, et ita densa, non dilaceratur, et ab eadem ejusdem humoris aliunde constituta non perfingitur. Pseudomembranarum fragmenta verum in corde quodamque intra plerumque super valvulis existebant. Coagulis sanguinis in cordis cavitatibus interdum producitur, et tunc in dicti polypi efformantur, quarum origo a *Kronig* constantiter repetita fuit a fibris tenacissime coagulatioque, quarum cordis ab ipso tali parte polypum occupata generat. *Morgagni* et *A. Pons* dubium movent an polypum sanguinis concretiones saltem post mortem aut saltem in aegre sunt, illam sub circulationis imperio, vasorumque actione coagulari posse denegantes. Inter corditidis sequelas parva inflammatio ejusque collectio, sive sub interna membrana, sive in ipso textu vasculis muscularis interstitiis enumeratur: nihilominus tamen veri cordis abcessus a numero lesionum anatomicarum enumerantur occurrentium excludendi sunt. Veteres observatores multa legentes de parte aut in pericardio aut in cordis superficie aut in interna ejusdem conage inventis: sed autem ista observationibus omnibus tribuenda non est, quoniam illarum plurimae confusio inter lympham coagulabilem et per superstruantur. Fide digna exempla legitimum abster-

eum, materiam purulentam in pericardii cavo detectas, et cordis alveolam inguntur apud *Lancet*, *Storck*, *Liesau*, *Mergel*, qui ultimae una vice in pericardii cavitate edas ingentem puris quantitatem invenit, ut a primo adspice non pericardium, sed magnam quandam abscessum videre crederet. Et memorabilis excretionis causam refertur a *Welder*, qui totum cor ab ulceribus sistens preflans, quas in ventriculo apertissimas antea aperiebatur perfectam cum tota superficie eam vidit. Mutationes vero, quae praesens a processu phlogistico in textu musculari indicantur varias esse possunt; et sine semper ita paulatim in substantiam mollem albicantem convertitur; fibrae musculares parum tuncitatis servant: tentus cellularis res connectiva flaccida, ipsaque collata materia lymphatica purulenta repleta: haec rursus per parte consumpta: systema vasculare admodum evolutum et superfundens cordis a pericardio debita digressu colorem adipis flavo-rosei, pallidi offert. Quae sit an cordis inflammatio in gangrenam alia possit? Si rationem tantam consilium quae sit sine negativa sunt paratranda, cor talis argueret ut tentus digressus, ut ejus scintilla inflammatio egros ceciderit, neque in gangrenam rursus deberet. Quod rursus docet parva anatomica, ut *Boileau*, et experientia confirmaret; saltem anim, in mortuibus, ut totam gangrenam factam haberemus ad summam hanc exitum cum aliquibus inflammationis ut vixi cadaveribus mollioribus confundendi facilitatem. Idem actor videtur, facta a *Decker*, *Boileau*, aliisque rebus, qui de cordibus postreductis, gangrenam plura verba habent ad adveniens optulere scintilla; et tunc ita incompleta et inexacte descripta invenimus, ut nulla plane fide digna haberi mereantur. Attento non desideramus scilicet a praedictis viris observantibus instituit, quas cordis gangrenam extra delium possent. Talia non antiqua partialis gangrenae exempla a *Senac*, *Liesau*, *Carlier*, *Tena*, *Kreling* et *Parot* collecta sunt, qui postremo in quodam momento aliam usque gangrenam observant; substantia cordis mollium magnam praesentat; eadem similitudo ducendatur, et valde per fluctat; color qui erat caruleo-obscuro et fibrarum muscularum interstitia ne guttulum quidem aquae continerent. Quibus evanidis perperam, in delium reversioni nequit, cardium non solum in membrana cor obvolvunt, rursus etiam in ipsius vasis compage considerant exitibus illis, qui in aliam corporis partem inflammationem succedunt aliquando possent, modificandis autem ad periculum illius reversionis referenda non neglecta.

Diversa a super descriptis mutationem in chronica audito gangrenae non minus vera periculum offensionem:

tum si in acuta citius expectandi egritudine vitam proxime minuetur, in lenta tacite et occulte illae metamorphosae organicae cordis exarantur, quae acutius temporibus pathologorum admirationem excitarere, quaeque cuncta arte eludenda praesidio, citi illae non letales citius, tamen morte ipsa peiores concedunt. Sub chronica cordis inflammatione variae mucosae degeneraciones, abscessus, productiones, indurationes, emollições, hypertrophias, atrophias, fibrinae, calcificationes, aneuryisma ferovitia, quae organiceorum tituli cadunt, pedestemini evolvuntur. Hoc localiter a pueri Thoma, qui egregio calamo de cordiacis morbis scripsit primitus demonstratum fuit, et post eam ab omnibus fere auctoribus, qui de hac argumenta operum eorum continere, et sunt illustres *Kreisig, Burns, Hodgson, Brown, Ipague Lacaze*, quorum eximiae ite vir cum illis non omnino consentiat phlogisi nonnullas denegando alterantes, quae eor, rursus majores ipsi attestantia sub processu inflammationis imperio rursus ascendunt. *Bodlaud* clare ostendentes, quae inter cordicidam, et varias organicae cordis affectiones existant capessit, et has postremas ab illa nimis aliter cum manifeste scientiae et humanitatis detrimento per longum tempus habuisse solitas, consequitur. *Andral* eandem opinionem circa relationem inter cordicidam, rursus cordis proficitur, ut sequentia quae dicta testantur « si phlogistica membranae internae cordis ad statum chronicum transeat, haec membrana crassior fit in eo speciatim loco, ubi ad valvulae ventriculi cordis ostium constitutenda duplicatur. Non solum crassior, rursus etiam eadem tot absorptionem vegetationum et degenerationem variisq. sinit. Textus valvularum fibrosae inflammatione corruptus mollior cartilagineus, et citius induere tendit; plurimum valvularum cordis ostium constrictione initium a phlogisi acuta et speciatim chronica membranae visceris cavitate obstruente habere. Sub chronica cordicida rursus substantia carnea hypertrophica redditur, sicuti accidit de tunica musculari ventriculi sub gastritide ». *Kreisig* postquam brevis historia ad thesorem de cordis inflammatione spectante compendium praebuerit concludit « si has inflammationes (cordis nempe, pericardii et vasorum majorum; tantummodo ab antiquis respiciantur, quomodo tuncq. origines fere omnium harum partium organiceorum lesionum rethori poterunt... Glaciatus *Reimann* quoque et cordicida lentae citius instrumentalis rursus considerat: dicit rursus frequentate talem lethalem evadit inducenda inequationes, indurationes, calcificationes valvularum, arteriarum coronariorum cum rigore pectoris *Mebardus* dicit symptomatibus et majorum vasorum phlebotomiam, polycoriam, excorpiemata cordis, angustationes circuituum ejus, aortae et arteriae pulmonalis,

net non si inflammatio membranam internam occupet, polypos cordis nascendo a coagulis polypi formam assumuntibus probe distinguendos. Sed auctoritates perusulas, quas enumeratis addere possem, brevitatis causa postulatibus nobis commendavimus, atque ad mentem revocare sat erit generales inflammationis effectus in atherando, tuberculando, pustulasque organicae partium structuras mutando, sufficit pathologicae metamorphosae in aliis visceribus ab eadem inductae processu attente animo examinare, et cordidam utpote illarum lesionum organicarum fontem habeamus, non exceptis quibusdam aneurysmaticis vegetantibus, quarum origo quondam in rheumatica, et immo de cordis dilatatione ab impetu, sanguinisque impulsione solammodo repanditur. De illis solum aneurysmatibus loquer, quae cum atherositate sic dicta cordis associata, et parietes ingrossas, crassas, induratas praedictorata cum immensis materialibus fibrinis stratis potius refringere, quam ulteriorem dilatationem ferre debent; de illis, in quibus dilatatio vagis, multiplicibus, lacerabilibus dissectionibus evenit, nulla modo a singulari columnae producta concipi potest; de illis, quae adhaerentes cum proximis partibus, parietibus jam antea laxioribus et abnormi materiae incrementis, contrahentibus, et magis magisque morbose vegetantibus crassas corrodunt, omnia destruant et usque, quae maxime oppositae constitutioni debent, eas ipsae activae vegetantes localiter putrescentes, cujus vi nil resistit ex praefecto ratione, quae solum resistere nequit praepotenti si copiosioris vegetantiae simul diuinae schismata, quae per minimum penetrant in ea profunda legit radices: de illis, quae usque ad extrema vires manent, dum in reliquis systemate assidue tactus fuit crassus extinctus, validissime pulsant in semetipsis vibrationis acceleratae causas tenent; de illis, quae cum aegrotis circuli conditionibus, cum vasculari anomalia, cum stimulis impotentibus, cum activis congestantibus, cum reactione universa coactata decurrere solent.

Ad praeventendas calamitates, quibus cordidæ acuta laborantes minantur, ad progressus inflammationis in exitum committendi cunctos plus minusve in organo tuos praestantes, ac mobilitate periculosos facillime sistunt celebrandos methodos antiphlogisticas promptis, generos et constant in auxilium vocanda. Non datur, inquit *Kreling*, inflammatio quae adeo acuta adeoque colluctata, menti haec subsidium capere, quantumque phlogosum cordis occurrentia fuerit remota. Monet idem auctor, quomodo *Boerhaave* in cordis vulneribus sanguinem ad deliquium neque eductum, neque ad maximum debilitatem redigere consuleret. In cordidæ epidemia a *Treacovi*

observata medicina ita in prima morbi die anni secunda hora venas aurore, dense phlogosin aliquantisper invasi-meretur, sanatas fuit. Hanc methodum sanguinem adhucendo Treacori viginti tentura super centum sangros venit, et praeterea omnes illos cathartes obtine, quibus intra viginti quatuor horas a prima morbi adquisitione medicum auxilium praestare nequibet, abstinere. Sanguis ergo depletionis tot vicibus repetitus, quoniam symptomatum perseverantia, morbiq; gravitas requirent, primam inter alia subidia in usum trahenda, locum tenent. Proceri ex ample valorem largiores quam in aliorum viscerum inflammationibus celebrandos, atque pro indicatione momentorum dignitate illico saepe saepius iterandos. Quandoque, praeterea morantibus, obque alia certa ad deliquium neque sanguinem solvendum licet. Juxta cunctorem Germanicam trepiditas in dicto casu genere hinc in casibus tanquam datae auro habenda. E contra deliquia, palsum delictum debilitatem, delaminationem insignem, quae lacubos statum, et dicunt nervosam metitotia ad perventum seducter curam possent, nos potius ad incertam therapiam continuandam coactare, quam ab ea removere debere advertit: et apponere constitutionis debilitas pueri ab alterioribus quacumque sanguine exactionibus medicum deterrere minime debet, nec enim aegrotus aut mortis, aut aliorum consequentia morborum morte ipse periturum victimis sit. » Euforet gratis erret, ab Bailloud, sicut momenta reansectiones contraindicantis habere deliquia, palsum pervitatem et inaequalitatem, cum hae phaeomena ipsius cordis distans effectus; neque alio modo circulatio ad normam redigi poterit, nisi distans inflammationem componenda. » Quilibet casus, quod, dum vixit aegri admodum depressus occurrat, dum palus debilis, parvi, irregularis et deliquia frequentia occurrant, hoc eveniat, quia adfectis graior et profunda partem viscera centrale et in primis flaveris nervos ad motus cordis directus inservientis minime aggreus sit. Praeterea revera illam morbum, qui aliquando inter symptomata et pathologicam conditionem contraindicationem significat jure meritoque semper meture. Fortasse, si cordis auctissima frequentia occurreret, cum insigni humanitatis amolimento nonnulli peritiosos medici discerneret, quoniam et utilitatis phylosophica distinctio inter physiologicam functionem debilitatem, autem ferre morbosum proprium (in salute cum tantum maxime fortitudine gradus habetur) et verum virum nullum languorem. Certe non est opendium, post aliquam vagantem adfectionem symptomatum inflammationis status evincendum casus; hae leges inflammationem advenantur, curas scilicet necessarias ab ipsam istius pathologie

processus naturae abiecit reddere, neque aliud eis afficere potest, nisi ejus gradum intra limites, qui integrum partium affectuorum structuram organorum relinquant, relinere. Plures autem, sicut *Laennec*, *Reimann*, *P. Frank* pro aptitudine idem therapeuticum tractatum, quod pro intertus pneumonitidis praedicatur, proponunt. Praeter ergo universales etiam locales hirsutines ope sanguinis subtractionis commendant, *Kruisig* vero, hirsutines in maris infirmitate propterea jure et tunc solum proficinas evadere, quando febris ad declinationem vergit, et pulsus amplius sit, equatam: quae in eam numero ut ingenti adplicata, *Komertatians* topicali sanguinis agrosus inveniderit. Videtur tamen haec topica evacuantes majorem afferre utilitatem, quando plerumque vena cordis, pericarditis de bellanda occurrat: a sedis cum proximitate atque a textus analogia inter plerumque costales et exteras cordis velamentorum affectus soluturus majore eam argumenta sperandi sunt. Saepius hoc in maris continuatas frigoris ad thoracem adplicationes sublevarius praescribuntur costis, et calidus est affectum *Hypocretia* « datur ad hoc quia vasomotio non tollit, tollunt hirsutinationes frigidae. » Cavendum tamen, ne in ejus adplicationes aliqua interruptio locum habeat: tunc enim in intervalla caloris alternantis actiois aegri subjunguntur et magis perceptas, valde et periculosas, quae intentioni labori succedat. Deinde sollicito adhibende, et cum profecto sublevis commenda videtur, anaphlogistae agentis, illa species, quae super organa circulationis centralia, universumque vasorum systema electricum exercent actionem, et ad vibrationes anaphlogicas reducenda, ad activas hirsutinationes componenda, ad vitium vasculare locutionem temperanda, atque ad vitium reactionis excedentem moderanda idonea existuntur. Ad haec generatim deinde medicorum consensum demandatur potius glaucina, nitrum, acida vegetabilia et mineralia diluta, aqua lauro-cerasi, digitalis trita haecata, squilla maritima, Scirum atque plura. Idem acidum hydrocyanicum convenienter administratum a nouaalis peritide haec in maris inventum fuit. Digitalis peritide medici tanquam parastimulationis virtutis remedio tractat, postquam ab illaribus *Julio Koseri*, *Beroli*, *Thommaris*, *Pomero*, *Grimmer* philosophia variis experimentis ejus actus existens compositum declarata fuit. Adnotandum tamen erant, haec pharmaca aliquando peculiaris esse pharmacum totius maris sanguinis circulationis, atque totius cum costis adhibendum. Deinde autem a digitali haec praescriptum in maris intertus producta organorum oportet, quae g. stratum ad sequenda relinquantur: a) Actus ejus tam electricus et potens super cor tanquam praecardialis atque ejus pectus

cule tactus et sibi quandoque coram motus suspendit, quæ actio super reliquum systema agens phlogisticum conditiones in universis organis sibi in quibusdam corporis partibus dislocantes diffuses interval modifiçasset; *d*) Nomen ejus effectum in phlogos circumstantiis retardatis, in quibus actio suspendere prompta necessaria evaderet; in actu tunc suspensa, ut in actu audaciter hinc periculum: *c*) Maximum discrimen, quod rebet ad effectus secundit jura varia temperamenta et hydiocrasias; conditiones, quas a priori non scilicet cognoscere et exacte subijcere calculo datum est; *d*) Perseverantia et tenacitas effectuum super cordis motum et adparatum nervosum, quas hæc tunc persistit, quando non amplius necessaria, immo damnum virtutis vitalium protacta deprensio evadent. Quibus conditionibus consideratis, nonnulli auctores digitalem hanc in casibus sponant. A celeberrimo Traversarii tenax hæc utpote immediata actio minus inserta proponitur, quod metaropis eadem universali atque electiva donatur virtute. Quod si antismialia et in primis tartarus stybiatus inter validissimos ad morbum incitacionem concutendum phlogos evocant, in audacis vero negant in coram administratione cautela exponant, ne remissus insurgat ob fortiam concussione, et universum æger agitationem scrupulosam vitandam. Ceterum et alia notissima antiphlogistica pro re nata suppeditanda. Ubi autem angustias et præcordialibus tamulibus turbas nervosæ, quales in individuis speciebus valde peris sensibilibus et irritabilibus quales systematicis nervosæ mobilitate prædictis edocuantur, aut aliam, aut aliis remissum medicamentibus extractis plantas virtutes cum jure opiam pro robore ventum, nempe extractum hyoscyami adhibendum. Necessarium interea est, actionem pharmacationem congruas auxiliari regimine. Ager in perfectis quibus tenetur, animi corporisque tranquillitas solo condilatur, æquabili nutui, strepitus, lux modica, elevata temperata atque accoritur, victus tenuissimus, potiones gelidæ, refrigerantes largiter haurire concedantur.

Phlogos cordis actionem moderatis periodo, non tam cito methodus antiphlogistica destrueda est; experientia enim tunc in hoc morbum genere facillime irritacionis anterioris subcultus, tamulit præcordiorum inexpectata, repentinæ effusionis hæc rurs lethales meditantur et tandem subdole ad elevacionem cordis transitis promoveretur. — Lentus cordis inflammationis cura non ventisiliter, sed gradu tantum diurna non debet. In hac postremo constanter principis et agrie et medicis maximopere commendanda: cordis cura lente diurna sub filigine lentius adprota decurrere sibi, aut hypoco-

22

delirio et hysteriae phaenomena communia praefereamus et
 plerumque negligimus, donec illae in corde haerementales,
 de quibus locuti sumus, metamorphoseos cras in expertis
 aegrot cum summo medicorum dedecore e vita tollant.

THESES DEFENDENDAE.

I.

Inter ventriculos et sinus cordis illud idem structuræ atque functionis discrimen, quod inter arterias et venas adnotatur.

II.

Lien tanquam systematis lymphatico-glandularis pars consideranda.

III.

Non dantur textus erectionis facultate prius donati.

IV.

Cutis non organon, sed organorum complexus.

V.

Glandula pinealis illam super cerebrum influentiam, quam plexus solaris super abdomen exerceat.

VI.

Terror ad pathemata deprimentia erronea demandatur.

VII.

Crisis salutis redeuntis effectus, non causæ.

VIII.

Ob inductionem physiologicam thymus, et capsulae atrabiliares utpote glandulae conglobatae retinendæ.

14

IX.

Relata ad decursum atque officium nervi majoris arteria, sensorii venis aequiparari possunt.

X.

Cellulae tentus cellulari inter se directe non communicant.

XI.

A cerebro proprio dicto nervi non proficiunt.

XII.

In impetiginibus folliculi sebacei adfectionis sedem constituunt.

